


Koloskopi

kikkertundersøgelse af tyktarmen

En koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen. Koloskopet er et lillefingertykt langt bøjeligt kikkertinstrument, der føres via endetarmen op i tyktarmen.

Undersøgelsens formål er bl.a. at finde årsagen til blødning, smerte eller ændret afføringsmønster. Udover kikkertfunktionen er det muligt at udtage vævsprøver igennem koloskopet, hvis der findes tegn på sygdom. Denne vævsprøvetagning er helt smertefri. Undersøgelsen varer ca. 60 minutter.



Ved koloskopi undersøges hele tyktarmen (og evt. sidste del af tyndtarmen i særlige tilfælde), medens man ved sigmoideoskopi, kun har mulighed for at undersøge venstre del af tyktarmen.

Før undersøgelsen

Du kan med fordel tage 2 tabletter Panodil/Pinex/Pamol 1 time før undersøgelsen, da der kan være smerter forbundet med undersøgelsen. Da der er mulighed for beroligende medicin under undersøgelsen, er det vigtigt at du har en der kan transportere dig hjem. Du må ikke selv må køre bil bagefter.

Hvis du har pacemaker eller får blodfortyndende medicin, skal det oplyses før undersøgelsen.

Forberedelse

For at få et godt resultat er det vigtigt at tarmen er udrenset, se vejledning vedr. dette.

Vedr. kosten – 3 dage op til udrensning

I de sidste 3 dage op til undersøgelsen må du ikke spise mad med synlige kerner – eksempelvis brød med kerne, hørfrø, sesamfrø, vindruer og lign.

Dagen før undersøgelsen indtages et let morgenmåltid (te og evt. 1 stk. ristet brød), herefter kun flydende kost (klar suppe uden grøntsager, saftvand, sodavand, vand). Drik rigeligt, mindst 2 liter. På selve undersøgelsesdagen indtages kun tynd flydende kost samt væske indtil 2 timer før undersøgelsen.

Vedr. udrensningen

Picoprep udrensningsmiddel lægges på Apotekernes server og kan afhentes gratis på et vilkårligt Apotek. Se vejledningen i **Picoprep** pakken. Udrensningen vil resultere i vandige diarréer.

Medicin

Vanlig medicin indtages med vand.

Selve undersøgelsen

Varer ca. 30-45 minutter. Man starter med at ligge på venstre side. I løbet af undersøgelsen kan man blive bedt om at lægge sig på ryggen eller højre side. Undersøgelsen kan i korte perioder medføre smerter, hvorfor der oftest gives forebyggende smertestillende medicin

Efter undersøgelsen

Du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Som anført må du ikke, hvis du har fået beroligende medicin, køre bil i 24 timer.

Komplikationer

Efter udtagningen af vævsprøver kan der komme en lille smule blod i afføringen det første døgn. I særdeles sjældne tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller hul på tarmen, som vil kræve indlæggelse på sygehus.

Søg læge

Skulle der efter undersøgelsen (evt. polypfjernelse) opstå blødning, smerter eller feber, skal du straks kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.

Svar på vævsprøver

Hvis der tages vævsprøver foreligger der typisk svar efter 2-3 uger. Du vil modtage en mail, hvor der står at du har modtaget svar fra Kirurgisk Center Møn.

For at læse svaret, skal du oprette dig som bruger/logge ind via forsiden på vores hjemmeside via "knap" i venstre side: **e-konsultation + book tid online**

Hvis svar kræver yderligere behandling eller udredning, vil du altid blive kontaktet herfra. Såfremt der allerede ved undersøgelsen er mistanke om noget ondartet, vil der ofte være svar indenfor 1 uge.

Afbud

Ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid eller udeblivelse, opkræves der, efter aftale med Danske Regioner, gebyr på kr. 500 og kr. 250 ved kontrol.

Erik Ditlev Hansen, speciallæge i kirurgi